

### Vor Einleitung der Therapie mit Cosentyx

#### Ausschluss von

- klinisch relevanten aktiven Infektionen (z.B. Tuberkulose, Hepatitis)<sup>1</sup>
- Schwangerschaft<sup>1</sup>

#### Anamnese

- chronische und rezidivierende Infektionen in der Vorgeschichte<sup>1</sup>
- Vor- und Begleiterkrankungen / andere Medikamente
- Familienplanung
- Impfstatus (Lebendimpfungen 6 Wochen vor Therapiebeginn abschließen)

#### Laborparameter <sup>\*2</sup>

- Großes Blutbild
- Leberwerte (Transaminasen, Alkalische Phosphatasen,  $\gamma$ -GT)

### Monitoring während der Therapie (quartalsweise)<sup>2</sup>

#### Anamnese

- Infektionszeichen
- besondere Vorkommnisse (z. Bsp. Operation, Impfung mit Lebendimpfstoff)
- Bestimmung von PASI und DLQI

#### Laborparameter

- keine Vorschrift zur Erfassung von Laborwerten<sup>1</sup>
- Empfohlen\*: Großes Blutbild, Leberwerte (Transaminasen, Alkalische Phosphatasen,  $\gamma$ -GT)<sup>\*2</sup>

1) Fachinformation Cosentyx; 2) Nast A. et al.: S3 - Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris Update 2017.

\*Empfohlene Untersuchungen wegen der zugrundeliegenden immunologischen Erkrankung